

TITRE XI – LISTE DES ESSENCES LOCALES


CATALOGUE des ESSENCES LOCALES recommandées pour la plantation

CONSEIL PRATIQUE Pour assurer une bonne reprise de vos plants, les premiers critères de choix doivent être l'adaptation au sol et l'exposition. Le caractère esthétique doit ensuite être adapté en fonction de ces premiers critères.

Nom Français	Nom latin	Feuillage	Type de haie	Exposition	Sol	PH	Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Mellifère	Toxicité
Ajone d'Europe	<i>Ulex europaeus</i>							1 - 2	10		Automne				
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>							15 - 20	90 à 130		Automne				
Argusier	<i>Hippocrepis emerus</i>							2 - 3	50		Automne				
Aubépine blanche***	<i>Crataegus monogyna</i>							2 - 10	500		Automne				
Aubépine grise	<i>Crataegus Pauli</i>							2 - 10	500		Automne				
Aune à feuilles en cœur	<i>Alnus cordata</i>							10 - 20	60 à 100		Automne				
Aune glauque	<i>Alnus glutinosa</i>							15 - 25	100		Automne				
Bourreau verticillé	<i>Betula pendula</i>							20 - 25	100		Automne				
Bourreau	<i>Fraxinus excelsior</i>							1 - 5	100 à 600		Automne				
Buis toujours vert	<i>Buxus sempervirens</i>							0,5 - 2	100 à 600		Automne				
Cassia	<i>Ribes nigrum</i>							1 - 2	50		Automne				
Carissier à grappes	<i>Prunus padus</i>							5 - 10	50		Automne				
Cerisier de sainte-Luce	<i>Prunus mahaleb</i>							4 - 12	50		Automne				
Charme commun (charme)	<i>Carpinus betulus</i>							10 - 25	100 à 150		Automne				
Châtaignier commun	<i>Castanea sativa</i>							20 - 25	500 à 1 500		Automne				
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>							25 - 35	400 à 1 000		Automne				
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>							20 - 40	500 à 1 000		Automne				
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera pauciflorum</i>							4 - 6	10		Automne				
Coronilla mâle	<i>Cornus mas</i>							2 - 6	300		Automne				
Coronilla sanguine	<i>Cornus sanguinea</i>							2 - 5	30		Automne				
Deutzia	<i>Deutzia magnifica</i>							2 - 3	50		Automne				
Églantier commun	<i>Rosa carnea</i>							1 - 5	+ de 50		Automne				
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>							12 - 15	150		Automne				
Erable plane	<i>Acer platanoides</i>							20 - 30	200		Automne				
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>							20 - 30	300 à 500		Automne				
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>							1 - 2	50		Automne				
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>							20 - 30	150 à 200		Automne				
Fusain d'Europe	<i>Eurostychia europaea</i>							2 - 6	50		Automne				
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>							1 - 3	10 à 25		Automne				
Grosellier à fleurs	<i>Ribes sanguineum</i>							1,75	10 à 25		Automne				
Grosellier à maquereaux	<i>Ribes uva-ursi</i>							0,60 - 1,20	10 à 25		Automne				
Grosellier fruit	<i>Ribes rubrum</i>							1,5 - 2	150 à 300		Automne				
Hêtre vert	<i>Fagus sylvatica</i>							30 - 40	150 à 300		Automne				
Hêtre pourpre	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>							30 - 40	150 à 300		Automne				
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>							2 - 10	300		Automne				

*** Disponible uniquement sur présentation d'une dérogation de plantation délivrée par la DRAAF.

LÉGENDE



Nom Français	Nom latin	Feuille	Type de haie	Exposition	Sol (de très sec à très humide)	pH (de très acide à très alcalin)	Type de sol	Hauteur (mètre)	Longévité (an)	Vitesse de pousse	Époque de taille	Floraison	Fructification	Mellifère	Toxicité
If commun	<i>Taxus baccata</i>						Argileux, limoneux, sablonneux, humides, léger	15-20	1 000			III-III	V-X		
Lierre	<i>Hedera helix</i>						Sols saboteux calcaireux avec argiles, limons, humides	L > 30				IX-X	III-IV		
Ulm sauvage	<i>Syringa vulgaris</i>						Sols ordinaires, profonds, riches, frais mais bien drainés	4-6			Ap. fin	IV-VI	V-X		
Mérissier	<i>Prunus avium</i>						Assez riches, argileux, limoneux, profonds	15-25	100			IV-V	V-X		
Néflier	<i>Mespilus germanica</i>						Sols pauvres à modérément pauvres, limoneux ou saboteux	2-4	50-150			V-VI	VIII-XI		
Nerprun rugueux	<i>Rhamnus cathartica</i>						Craieaux saboteux, argileux, calcaireux	2-5				V-VI	VIII-X		
Noisetier coudrier	<i>Corylus avellana</i>						Argileux, limoneux, humides	2-4	30 à 60			III	IX		
Noisetier pourpre	<i>Corylus avellana</i> <i>Purpurea</i>						Argileux, limoneux, humides	2-4	30 à 60			III	IX		
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>						Argileux, limoneux, calcaireux, froids	20-25	300 à 400			IV-V	IX-X		
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>						Sols riches, alluviaux, argileux, limoneux, vifs, saboteux	10-35	400 à 500			III-IV			
Orme résilient	<i>Ulmus Lutea 'Narguen'</i>						Sols riches, alluviaux, argileux, limoneux, vifs, saboteux	10-35	400 à 500			III-IV			
Pévéniche	<i>Vincet</i>						Terrés fraîches mais drainantes	0,25-0,50				IX-X			
Peuplier noir (NRA) <i>actuellement indisponible</i>	<i>Populus nigra</i>						Limons, sables, alluviaux	25-30	> 400			III-IV			
Peuplier sauvage	<i>Populus pyramidalis</i>						Argileux, limoneux	10-15	200			IV-V	VIII-X		
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>						Argileux, limoneux, profonds	5-12	70 à 100			IV-V	VIII-X		
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>						Limons, argileux ou craieaux + caillouteux, vifs, saboteux	1-4	50-80			IV	VIII-X		
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>						Argileux, limoneux, saboteux, humides, légers	8				IV-V	VIII-X		
Saule blanc	<i>Salix alba</i>						Argileux, limoneux, saboteux	2-20	300			IV-V			
Saule coudré	<i>Salix omora</i>						Sols tourbeux, humides	2-4	30			IV-V			
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>						Argileux, limoneux, saboteux	2-10	50-60			III-IV			
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i>						Drainé	1-4	50			III-IV			
Saule des vaniers	<i>Salix viminalis</i>						Graie, sables, limons...	3-10	50			IV-V			
Seringat	<i>Philadelphus coronarius</i>						S'adapte à la plupart des sols	2,50			Ap. fin	V-VI			
Sortier domestique - Comier	<i>Sorbus domestica</i>						Argileux à calcaire	5-20	500			IV-VI	VIII-X		
Sortier des dieux	<i>Sorbus aucuparia</i>						Pauvres à modérément pauvres, saboteux, limoneux	10-20	120 à 150			IV-VI	VIII-X		
Spirée de Douglas	<i>Spiraea douglasii</i>						Sols non calcaire, légers et froids	1,50-2			Hiver	IV-VIII			
Spirée de Vanhoutte	<i>Spiraea x vanhouttei</i>						Bonne terre de jardin	1,50-2			Hiver	IV-VI			
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>						Argileux, limoneux, légers	2-15	50 à 100			V-VI	IX-X		
Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i>						Sols ordinaires bien drainés	1-3			Hiver	V-X	IX-XI		
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>						Sols riches, argileux, limoneux, sur goudes ou substrats	20-35	500			V-VI			
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>						Sols pauvres à assez riches, argileux, limoneux	20-30	500			V-VI			
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>						Calcaireux, limoneux, saboteux, argileux, humides	2-3				V-VI	VIII-X		
Vierne laniane	<i>Viburnum lantana</i>						Sols pauvres à modérément riches, argileux, limoneux, alluviaux	1-3	30 à 50		Ap. fin	V-VI	VIII-X		
Vierne adieu	<i>Viburnum opulus</i>						Sols marneux, argileux, limoneux	2-4	20 à 30		Ap. fin	V-VI	VIII-XI		

Liste des essences invasives interdites pour une haie recommandée par le PNRBSN



Liste des espèces invasives (Liste_EEE_HN_2012)

Nom latin	Nom français
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule
<i>Acer negundo</i> L.	Érable négondo
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Sagittaire à larges feuilles
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier tardif
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Lev.	Berce du Caucase
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hydrocotyle fausse-renoncule
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén et St John	Lysichiton américain
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie annuelle
<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. et A. Gray	Ambrosie vivace
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Aster lancéolé
<i>Aster salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharis à feuilles d'arroche ; Sénéçon en arbre
<i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd.	Bident soudé
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>anomala</i> Porter ex Fernald	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>frondosa</i>	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Conyza bilbaoana</i> J. Rémy	Vergerette de Bilbao
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Vergerette de Sumatra
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Inule fétide
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Sénéçon du Cap
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada ; Gerbe d'or
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balsamine de Balfour
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs
<i>Berteroia incana</i> (L.) DC.	Alysson blanc
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddléia de David ; Arbre aux papillons
<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corispeme à fruits ailés
<i>Comus sericea</i> L.	Comouiller soyeux
<i>Crassula helmsii</i> (T. Kirk) Cook.	Crassule de Helms ; Orpin des marais

<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron des parcs
<i>Euphorbia »pseudovirgata</i> (Schur) Soó	Euphorbe fausse-baguette
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Cytise faux-ébénier ; Aubour
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil
<i>Egeria densa</i> Planch.	Égérie dense
<i>Elodea callitrichoides</i> (L.C.M. Rich.) Caspary	Elodée fausse-callitriche
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Élodée de Nuttall
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Lagarosiphon
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lentille d'eau minuscule
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau à turions
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Jussie à grandes fleurs
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Ludwigie fausse-péplide (s.l.)
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Ludwigie de Montevideo ; Jussie fausse-péplide
<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn.	Herbe de la Pampa
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles rudes
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>brevipila</i>	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>multinervis</i> (Stohr) Dengler	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchc.	Glycérie striée
<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino	
<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard	Spartine anglaise
<i>Spartina »townsendii</i> H. et J. Groves	Spartine de Townsend
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene	Renouée du Japon
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene var. <i>japonica</i>	Renouée du Japon (var.)
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Renouée de Sakhaline
<i>Fallopia »bohemica</i> (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey [Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene x Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene]	Renouée de Bohême
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Spirée à feuilles de saule
<i>Mimulus guttatus</i> DC.	Mimule tacheté
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux
<i>Datura stramonium</i> L.	Stramoine commune
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Stramoine commune (var.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Hupke	Stramoine commune (f.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>stramonium</i>	Stramoine commune (f.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>fatula</i> (L.) Torr.	Stramoine commune (var.)
<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>fatula</i> (L.) Torr. f. <i>fatula</i> (L.) Danert	Stramoine commune (f.)
<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet commun
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Staphylier penné ; Faux-pistachier
<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vigne-vierge commune